



Clytus rhamni ssp. *bellieri*.
Foto Alfonso Maíllo Oliver



Clytus rhamni ssp. bellieri

Escarabat avespa

Per Alfonso Maíllo Oliver

Coleòpter de la família *Cerambycidae*. Té coloració aposemàtica (d'advertiment) negra i groga imitant una avespa, per mimetisme batesià (estratègia que consisteix en pareixer un animal perillós, tot i que és inofensiu, en contraposició al mimetisme mullerià, en que l'imitador sí presenta perill).

La imitació en lo cas de l'escarabat avespa no es limita al color, sino que mou les antenes amb una cadència com la de les avespes, es belluga com a n'elles i vole i emitís un zumbit com lo de les avespes.

Les larves viuen davall de l'escorça d'arbres i mates caducifòlies mortes, de *Castanea*, *Quercus*, *Ficus*, *Ulmus*, *Pyrus*, *Prunus*, *Padus*, *Rhamnus*, *Pistacia*, *Paliurus*...

Lo cicle de vida complert dura dos anys, i los adults ixen a la primavera del segon any. Los adults volen de dia, des de mitjans de primavera hasta mitjans d'istiu. Minjen nèctars, pol·lens, fusta i detritus vegetals (polífags).

Distribució: oest de la regió Paleàrtica.

S'identifica aquesta espècie perquè té les dos taques grogues de la part alta del cos en diagonal i les antenes clares (a diferència de *Clytus arietis*, de taques rectes i antenes oscures), i la subespècie es detecta perquè te lo fémur obscur i la resta de la pota clara.

A Tamariu, primer i únic avistament.

